



BAGAIMANA CARA MENGHINDARI TIKUS DI DALAM/LUAR GEDUNG



GUNAKAN WADAH ANTI TIKUS UNTUK MENYIMPAN MAKANAN



GUNAKAN TEMPAT SAMPAH TERTUTUP DAN LETAKKAN 45 cm DARI TANAH



GUNAKAN CAT BERTEKSTUR LICIN DI BAWAH JENDELA SELEBAR MINIMAL 10 CM



MENAMBAL LUBANG PADA SALURAN AIR & MEMBERI PENGHALANG PADA TALANG AIR



MEMOTONG CABANG POHON YANG BERSENTUHAN DENGAN RUMAH



PASANG PERANGKAP DI DALAM GEDUNG



PENANGGULANGAN & PENGENDALIAN FAKTOR RESIKO LEPTOSPIROSIS



PASANG PERANGKAP MATI ATAU HIDUP



ALAT PENGAMAN UNTUK PENANGANAN TIKUS YANG TERTANGKAP: SARUNG TANGAN, KANTONG PLASTIK DAN MASKER



PASANG PERANGKAP DI DALAM RUMAH



MASUKAN TIKUS YANG TERPERANGKAP KE DALAM EMBER BERISI AIR SAMPAI TIKUS MATI



KUBUR ATAU BAKAR TIKUS YANG MATI



BUANG AIR BEKAS RENDAMAN TIKUS KE TANAH KERING. AIR JANGAN DIPAKAI ULANG

Informasi lebih lanjut akses

media sosial Puskesmas Purworejo

081399136931

puskpurworejo@gmail.com


Puskesmas Purworejo



Puskesmas Purworejo



WASPADA LEPTOSPIROSIS



? APAKAH ITU LEPTOSPIROSIS

LEPTOSPIROSIS adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan bakteri *Leptospira* sp. Menular dari hewan ke manusia dan dapat berakibat kematian.

BAGAIMANA CARA PENULARANNYA?

Penularan bisa terjadi bila kontak dengan lingkungan, air, tanah becek, atau lumpur yang mengandung bakteri *Leptospira* Sp. di mana bakteri masuk melalui kulit luka/lecet

SUMBER PENULARAN



FAKTOR RISIKO PENULARAN



Tinggal atau beraktivitas di wilayah banjir



Wilayah pemukiman banyak ditemukan tikus



Melakukan aktivitas di sungai



Melakukan olahraga air/berenang/ triathlon



Risiko pekerjaan petani, peternak, petugas kebersihan, petugas pemotongan hewan, tentara, dll.



MASA INKUBASI LEPTOSPIROSIS

Antara 2 - 30 hari

Rata-rata 7 - 10 hari



BAGAIMANA GEJALA LEPTOSPIROSIS

Leptospirosis Ringan (anikterik)



Demam
(38.5° C/lebih tinggi)



Sakit kepala



Badan lemah



Nyeri otot, hingga kesulitan berjalan



Kemerahan pada selaput putih mata (conjunctival suffusion)




Kekuningan (ikterik) pada mata dan kulit.


Leptospirosis Berat



Ikterus (kuning)



Disfungsi ginjal



Nekrosis hati



Disfungsi paru-paru



Pendarahan



BAGAIMANA PENCEGAHANNYA?



SIMPAN MAKANAN & MINUMAN AGAR AMAN DARI TIKUS



CUCI TANGAN & KAKI DENGAN SABUN SETELAH BEKERJA DI SAWAH, KEBUN, SELOKAN, DLL



MENYEDIAKAN & MENUTUP RAPAT TEMPAT SAMPAH & PENAMPUNGAN AIR



MENJAGA KEBERSIHAN LINGKUNGAN



MENINGKATKAN PENANGKAPAN TIKUS



TUTUP LUKA DENGAN PERBAN KEDAP AIR



PAKAI SEPATU BOOT JIKA KE DAERAH BASAH / KOTOR



YANG DILAKUKAN JIKA MENGALAMI GEJALA-GEJALA



Jika mengalami gejala Leptospirosis ringan atau berat, dan ada riwayat terpapar air banjir, tanah becek atau lumpur dalam 2 minggu sebelum sakit, maka segera ke Puskesmas atau sarana kesehatan terdekat.

Segera minta bantuan ke tenaga medis untuk penanganan penyakit Leptospirosis.